MESO E MICROELEMENT | Chelati di ferro

S3 Rinverdente



Miscela di microelementi a base di Ferro e Manganese

Elevata concentrazione e purezza.

Veloce assimilazione e rapido rinverdimento.

Specifico per prevenire e curare gli ingiallimenti fogliari.







Componenti: Ferro chelato DTPA, Manganese chelato EDTA, Alga Macrocystis.

Modalità d'azione e vantaggi agronomici: S3 RINVERDENTE è l'innovativa formulazione a base di Ferro e Manganese, specifica per prevenire e curare rapidamente gli ingiallimenti fogliari. Grazie all'agente chelante fotoresistente (Fe-DTPA), S3 RINVERDENTE, risulta altamente efficace a livello fogliare, inoltre, la presenza di manganese ne migliora l'efficacia nella cura della clorosi e aumenta la potenzialità fotosintetica delle piante trattate.

Il formulato è arricchito con estratti di alga marina "Macrocystis Integrifolia" che ne migliorano l'efficienza di utilizzo incrementando l'assorbimento degli elementi nutritivi. Gli estratti di alga svolgono, inoltre, un'azione biostimolante diretta sul metabolismo vegetale, migliorando lo sviluppo delle piante e incrementando la resistenza agli stress.

Analisi e proprietà chimico-fisiche:

Alialisi e proprieta cilillico-lisicile.	
Ferro (Fe) solubile in acqua	30
Ferro (Fe) chelato con DTPA	30
Manganese (Mn) solubile in acqua	20
Manganese (Mn) chelato con EDTA	29

pH 0.1%	EC 0.1% mS/cm	Densità g/ml
6.92	0.15	1.25

Taglia: 1 |

Metodo di applicazione: FOGLIARE

Impiegare il formulato con volumi di acqua di 1000 litri/ha per le colture arboree-ortaggi e di 500 litri/ha per le colture industriali.

Colture	Dose
Colture frutticole	1.0-1.5 (litri/ha)
Colture orticole da foglia	0.8-1.2 (litri/ha)
Colture orticole in generale	1.0-1.5 (litri/ha)
Colture industriali	1.2-1.5 (litri/ha)
Vivai, Piante floricole ed ornamentali (*)	0.8-1.5 (litri/ha)

^(*) Si consiglia di non trattare con petali visibili.

Trattamenti preventivi: Si consigliano applicazioni, alla dose più bassa, a partire dalle prime fasi vegetative, ripetute ogni 10-12 giorni, per 2-3 volte.

Trattamenti curativi contro gli ingiallimenti: Eseguire 3 applicazioni, alla dose più alta, distanziate di 8-10 giorni al verificarsi dei primi sintomi di ingiallimento.

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.

Miscibilità: S3 RINVERDENTE è miscibile alla dose d'impiego con i formulati CIFO e gli antiparassitari in genere ad eccezione degli oli minerali, insetticidi a base oleosa, del phosethyl-Al, delle dodine, delle triforine; in ogni caso si consigliano prove di miscibilità preliminari.